


Auf der Suche nach dem „Großen Wächter“


Eine Auswertung der Daten der
vergangenen Winter.




Areale
Raubwürger
mit seinen
Unterarten



Karte der Brutareale




Karte der Winterbeobachtungen




Ein paar Zahlen ...

- Brutpaare in Europa: 250.000 bis 400.000 (Birdlife International, 2004)
69.000 bis 176.000 (Birdlife International, 2015)
- Brutpaare in Deutschland: 2.100 bis 3.200 (Adebar, 2014)
1.500 bis 2300 (Vögel in Deutschland, 2019)
- Brutpaare in MV: 280 bis 350 (2. BV-Atlas, 2012)
- Winterbestand in Deutschland oder MV: ?
- 0,09 – 0,22 Ex/km² (Klafs 1973 in Klafs und Stübs, 1987)
- Ältester Raubwürger nach Beringung: >8 Jahre und 2 Monate
(finnischer Kontrollfang, Quelle: <https://euring.org/data-and-codes/longevity-list?page=5>)

Phänologie MV in Pentaden - 2010-2021 (n=6535)



Phänologie OVP in Pentaden - 2007-2021 (n=1276)






Ein paar Zahlen, die zur Auswertung gekommen sind ...


- Anzahl Datensätze Datenbank FG-Greifswald: 1288 (Start 2007)
- Anzahl Datensätze aus ornitho: 466 (Start 2011)
- Anzahl Datensätze mit Koordinaten: 1375

- Beobachter Datenbank FG-Greifswald: 90
- Beobachter ornitho: 123

Raubwürger in den Wintern 2004/2005 bis 2021/2022 in OVP




Raubwürger in den Wintern 2004/2005 bis 2021/2022 in OVP



Ergebnisse im Winter 2020/21


- Datensätze insgesamt: 203
- Anzahl Raubwürgerbeobachtungen: 155
- Null-Zählungen: 48
- Angenommene Reviere: 47
- davon durch Mehrfachbeobachtung bestätigt: 21
- % Kontrollfahren mit Rw-Beobachtungen: 76
- Kontrollierte Fläche: $\sim 1250 \text{ km}^2$
- abzüglich Waldgebiete, Ortschaften, besiedelte Fläche: $\sim 1000 \text{ km}^2$
- 2020/2021: 4,7 Raubwürgerreviere pro 100 km^2 besiedelbare Fläche

Phänologie Winter 2020/21 von Anfang Oktober bis Ende März in OVP



Winter
2020/21






Ergebnisse im Winter 2021/22

- Datensätze insgesamt: 146
- Anzahl Raubwürgerbeobachtungen: 105
- Null-Zählungen: 41
- Angenommene Reviere: 7
- davon Mehrfachbeobachtung: 12
- % Kontrollfahren mit Rw-Beobachtungen: 72
- Kontrollierte Fläche: $\sim 1250 \text{ km}^2$
- abzüglich Waldgebiete, Ortschaften, besiedelte Fläche: $\sim 1000 \text{ km}^2$
- 2020/2021: 0,07 Raubwürgerreviere pro 100 km^2 besiedelbare Fläche


Phänologie Winter 2021/22 von Anfang Oktober bis Ende März in OVP



Winter
2021/22





Phänologie Winter 2021/22 von Anfang Oktober bis Ende März in OVP




Ergebnisse:
Dirk Schulze

blau: alle Beob.
rot: Winter 2021/22







Ergebnisse:
Pelle Annen 2021/2022



Alle Beobachtungen MTB 2544, 2644
Ergebnisse 2021/2022
Reinhard Simon ohne Beobachtungen



alle Beobachtungen
Mehrere MTB Südwest-MV



Ergebnisse 2021/2022:
Gerd Fehse,
Joachim Lindenau u.a.

Regenmoor Lassan



Revier bei Buggow





Revier bei Pamitz



Revier bei Klitschendorf



Foto: Moritz Preckel

Shrikes

species:

Great Grey Shrike

scientific name:

Lanius excubitor

notes:

Red ring with a white two alpha-numeric code (letter/number) (on one leg) and metal ring (on other leg).

note 1 : used letters and numbers are : A, C, F, H, J, L, M, N, P, R, T, U, V, W, and X, and numbers 0-9.

note 2 : birds ringed in Saxony-Anhalt.

note 3 :

email sighting submit:

Rene.Thiemann@lau.mlu.sachsen-anhalt.de

contactperson:

René Thiemann

colour-ring type:

Legring : one, coded.

colour-ring colour (of the c-ring):

Red [R]

colour-ring code (of the c-ring):

Two alpha-numeric code (2 letters/numbers).


countries where ringed:

Germany.

Anlass des Starts eines
Beringungsprogramms in OVP
war der Fang eines dj Raubwürgers
auf dem Langenwerder



Blau: Reviere Winter 2022/2023
Rot: Fang und Beringung eine Raubwürgers















Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.